



АПТЕЧКА

Градусник. Нормальная температура у собак от 37,5 до 39,5. (у щенков обычно температура может быть чуть выше). Если вы заметили какие-то признаки недомогания у собаки, то измеряем температуру ректально, предварительно смазав вазелином. В случае изменения температуры, необходимо обратиться ветврачу.

Антибиотик наружно

- ✓ банеоцин
- ✓ левомеколь
- ✓ раносан

Антисептик наружно

- ✓ хлоргексидин 0,5%
- ✓ мирамистин
- ✓ перекись водорода (только для отмачивания корочек со швов)
- ✓ физраствор для промывания раны, для разведения препаратов)

Перевязочные материалы

- ✓ самофиксирующийся бинт: в человеческой аптеке очень слабой фиксации, рекомендую ветеринарный
- ✓ обычный бинт
- ✓ стерильная марлевая салфетка
- ✓ пластырь в катушке на тканевой и на пленочной основе
- ✓ жгут (с большой осторожностью, не накладывать на срок более 10 минут)
- ✓ если вы видите отек конечности, то снять бинт, сделать массаж, дождаться спада отека и следующую повязку сделать в 2 раза менее тугой

Сорбенты (при диарее, подозрении на отравление)

- ✓ энтеросгель/энтерозоо (0,5 мл на кг веса животного 2-3 раза в сутки до нормализации стула)



Питомник кавалер кинг чарльз спаниель

Сайт: cavalier-dog.ru | Тел.: +7 (985) 287-32-49 | E-mail: alfacat@list.ru

- ✓ смекта (пакетик развести на 20 мл воды, выпаивать по 0,5 мл на 1 кг веса животного 2-3 раза в сутки до нормализации стула)

Гастропротекторы (при рвоте)

- ✓ альмагель (зеленый/фосфалюгель по 0,5 мл на 1 кг веса животного 2 раза в сутки за 30 мин до еды)
- ✓ разо/Омес 1 мг на 1 кг веса животного внутрь, 2 раза в сутки
- ✓ при диарее - голодная диета
- ✓ многократная рвота может быть симптомом, например, непроходимости, без ветеринарной помощи это смертельно. При длительной/обильной/многократной болезненной диарее также необходимо обратиться к ветеринару.

Антигистаминное средство (аллергия, отек):

- ✓ Зиртек/зодак (например при укусе осы) 2 мг на 1 кг веса животного, 2 раза в сутки

Обезболивающие средства и спазмолитики:

- ✓ спазган в инъекциях (внутримышечно) или в таблетках, в дозе 20 мг/кг, 2 раза в сутки
- ✓ папаверин в инъекциях (подкожно) в дозе 0,1 мг/кг веса животного 2 раза в сутки

Дополнительно

- ✓ шприцы 1,2,5 и 10-20 мл
- ✓ кровоостанавливающая пудра (если при стрижке когтей задела сосуд)
- ✓ лосьон дл глаз, если попал песок или пыль. Также я могу закапать еще и
- ✓ офтальмоферон, окомистин, если вижу разовое загрязнение глаза выделениями.



Питомник кавалер кинг чарльз спаниель

Сайт: cavalier-dog.ru | Тел.: +7 (985) 287-32-49 | E-mail: alfacat@list.ru

Аптечка не заменяет прием врача: при любых сильных или длительных симптомах, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарную клинику.

В этой статье указаны наиболее безопасные препараты. Ваш врач, зная ваше животное и анамнез, может назначить другое лечение. Если вы считаете, что какие-то другие препараты обязательно должны быть в вашей аптечке, также обратитесь заранее к врачу за назначением и расчетом дозировки.